

Protokol o zjištění smrti		
Jméno a příjmení pacienta:.....Rodné číslo:...../.....		
Pracoviště:.....		
Číslo chorobopisu:.....Číslo zdravotní pojišťovny.....		
1. lékař zjišťující smrt (lékař A): 2.lékař zjišťující smrt (lékař B):		
.....		
pracovní zařazení.....pracovní zařazení.....		
I. Zjištění smrti průkazem nevratné zástavy krevního oběhu		
Zjištěna nevratná zástava krevního oběhu:		
lékař A:		
.....
datum	čas (hod:min)	podpis
lékař B:		
.....
datum	čas (hod:min)	podpis
II. Zjištění smrti průkazem nevratné ztráty funkce celého mozku		
1. Předpoklady, na základě kterých lze uvažovat o diagnóze smrti mozku		
1.1. Diagnóza základního mozkového postižení:		
lékař A:.....lékař B:.....		
1.2. Vedlejší diagnózy		
lékař A.....lékař B.....		
1.3. Datum a čas úrazu nebo onemocnění		
lékař A:.....lékař B:.....		
(den, měsíc, rok) (hodina : minuta) (den, měsíc, rok) (hodina : minuta)		
Bylo vyloučeno, že na bezvědomí se v okamžiku vyšetření podílí (odpověď ano/ne):		
	lékař A	lékař B
intoxikace		
tlumivé a relaxační účinky léčiv		
metabolický nebo endokrinní rozvrat		
primární podchlazení		
2. Klinické známky smrti mozku		
2.1. první vyšetření		
	lékař A	lékař B

fotoreakce-oboustranně chybí(odp. ano/ne)		
korneální reflex-oboustranně chybí (ano/ne)		
vestibulookulární reflex – oboustranně chybí (ano/ne)		
motorická reakce při algickém podráždění v inervační oblasti n. trigeminus- oboustranně chybí (ano/ne)		
kašlací reflex provokovaný hlubokým tracheobronchiálním odsáváním – chybí (ano/ne)		
trvalá zástava spontánního dýchání(pouze u dětí do 1 roku) -apnoický test při $p_a\text{CO}_2$mm Hg-splněn (ano/ne)		
hluboké bezvědomí (Glasgow coma scale-skóre)		

2.2. druhé vyšetření

lékař zjišťující smrt (lékař C): 4. lékař zjišťující smrt (lékař D):

.....
pracovní zařazení.....pracovní zařazení.....

(vyplnit v případě, že druhé vyšetření provádí jiný lékař než lékař A a B)

lékař A	lékař B
lékař C	lékař D

fotoreakce-oboustranně chybí(odp. ano/ne)		
korneální reflex-oboustranně chybí (ano/ne)		
vestibulookulární reflex – oboustranně chybí (ano/ne)		
motorická reakce, při algickém podráždění v inervační oblasti n. trigeminus- oboustranně chybí (ano/ne)		
kašlací reflex provokovaný hlubokým tracheobronchiálním odsáváním – chybí (ano/ne)		
trvalá zástava spontánního dýchání -apnoický test při $p_a\text{CO}_2$mm Hg-splněn (ano/ne)		
hluboké bezvědomí (Glasgow coma scale-skóre)		